



ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ
TURKISH ONCOLOGY PHARMACY ASSOCIATION

studii in omni melleumetum incho vider



ORAL ONKOLOJİ İLAÇLARI 2017

ECZ. HALE TURGUT

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİV. DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞ. HAST. ECZANESİ

ONKOECZADER ORAL ANTİNEOPLASTİKLER ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI



SUNUM ÖZETİ



COTELLIC



ZELBORAF



İBRANCE



TARCEVA



NEXAVAR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



COTELLİC (KOBİMETİNİB) 20 MG/63 TB



- ▶ GÜNDE TEK DOZ 60 MG
- ▶ 3 HAFTA KULLANILIR, SONRASINDA 1 HAFTA ARA VERİLİR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ

COTELLİC (KOBİMETİNİB) 20 MG/63 TB

- ▶ UNUTULURSA 12 SAATE KADAR ALINABİLİR
- ▶ KUSMA HALİNDE EK DOZ ALINMAMALI

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



COTELLİC (KOBİMETİNİB) 20 MG/63 TB



- ▶ ÇİĞNENMEMELİ, EZİLMEMELİ
- ▶ AÇ VEYA TOK ALINABİLİR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



COTELLİC (KOBİMETİNİB) 20 MG/63 TB



- ▶ MALİGN MELANOM (RELAPS VEYA METASTATİK)
 - ▶ DAHA ÖNCE RAF YOLAĞI İNHİBİTÖRÜ KULLANMAMIŞ
 - ▶ ECOG PERFORMANS SKORU 0 VEYA 1 OLAN
 - ▶ BRAF V600 MUTASYONU POZİTİF OLAN HASTALARDA



COTELLİC (KOBİMETİNİB) 20 MG/63 TB



- VEMURAFENİB İLE KOMBİNE TEDAVİ

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



COTELLİC (KOBİMETİNİB) 20 MG/63 TB



► YAN ETKİLER;

- GÖRME SORUNLARI,
- KALP OUTPUTUNUN AZALMASI,
- İSHAL,
- DERİDÖKÜNTÜLERİ....

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



ZELBORAF (VEMURAFENİB) 240 MG/56 TB



- ▶ GÜNDE İKİ KERE 960 MG (HASTA UYUNCU!!!)
- ▶ 4 HAFTA BOYUNCA KULLANILIR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ

ZELBORAF (VEMURAFENİB) 240 MG/56 TB

- ▶ UNUTULAN DOZ 8 SAATDEN ÖNCE İSE KULLANILABİLİR
- ▶ ÇIĞNENMEMELİ, EZİLMEMELİ
- ▶ AÇ VEYA TOK ALINABİLİR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



ZELBORAF (VEMURAFENİB) 240 MG/56 TB



- ▶ MALİGN MELANOM (METASTATİK VEYA İNERERABL)
- ▶ YALNIZCA BRAF GENİNDE MUTASYONA UĞRAMIŞ HASTALAR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ

ZELBORAF (VEMURAFENİB) 240 MG/56 TB

- ▶ YAN ETKİLER
 - ▶ GÖZ PROBLEMLERİ
 - ▶ KALP HASTALIKLARI
 - ▶ PANKREATİT
 - ▶ DÖKÜNTÜ
 - ▶ İSHAL
- ▶ KULLANIMINDA GÜNEŞTEN KORUNMALI!!!

Week 1 (days 1-7):

Take both COTELLIC and ZELBORAF

Week 2 (days 8-14):

Take both COTELLIC and ZELBORAF

Week 3 (days 15-21):

Take both COTELLIC and ZELBORAF

Week 4 (days 22-28):

Stop taking COTELLIC during the 7-day treatment break. Continue taking ZELBORAF during this week.



İBRANCE (PALBOCİCLİB) 75-100-125MG/21 TB



- ▶ DOZ HASTAYA GÖRE AYARLANIYOR
- ▶ 28 GÜNLÜK SIKLUSLARDA 21 GÜN ARALIKSIZ KULLANILIYOR,
1 HAFTA ARA VERİLİYOR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



İBRANCE (PALBOCİCLİB) 75-100-125MG/21 TB



- ▶ ÇİĞNENMEMELİ, EZİLMEMELİ, KAPSÜLLER AÇILMAMALI,
- ▶ HER GÜN AYNI SAATDE GIDALARLA BERABER ALINMAMALI

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



İBRANCE (PALBOCİCLİB) 75-100-125MG/21 TB



► METASTATİK MEME KANSERİ

- POSTMENAPOZAL DÖNEMDE HORMON ANTAGONİSTİ OLAN LETROZOLE(FEMARA) VEYA FULVESTRANT(FASLODEX) İLE BERABER KULLANILIR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



İBRANCE (PALBOCİCLİB) 75-100-125MG/21 TB



► YAN ETKİLERİ

- NÖTROPENİ
- KANAMAYA EĞİLİM,
- TİTREME
- ÖKSÜRÜK
- BOĞAZDA AĞRI, ŞİŞLİK
- İSHAL



TARCEVA (ERLOTİNİB)

25-100-150 MG/30 TB



- ▶ DOZ HASTAYA GÖRE AYARLANIR
- ▶ BEKLENEN ETKİ ALINANA KADAR VEYA TOLERE EDİLEMİYEN TOKSİK ETKİ GÖRÜLENE KADAR KULLANILIR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



TARCEVA (ERLOTİNİB) 25-100-150 MG/30 TB



- ▶ AÇ VEYA TOK KULLANILABİLİR
- ▶ ÇİĞNENMEMELİ, EZİLMEMELİ
- ▶ KULLANIMINDA SİGARA BIRAKILMALI

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĐİ



TARCEVA (ERLOTİNİB) 25-100-150 MG/30 TB



- ▶ KÜÇÜK HÜCRELİ OLAMAYAN AKCİĞER KANSERİ
- ▶ EGFR MUTASYON TESTİ YAPILMALIDIR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĐİ



TARCEVA (ERLOTİNİB) 25-100-150 MG/30 TB



► YAN ETKİLERİ

- DİYARE (%50)
- HEPATOTOKSİSİTE; KCFT İZLENİLMELİ, KC YETM'DE DOZ AYARLAMASI
- GASTROİNTESTİNAL PERFORASYON; PPI VE H2 RES BLOKERLERİ İLACIN BİYİYAYARLANIMINI ETKİLİYOR!!!!
- BÜLLOZ VEYA EKSFOLİYATİF DERİ HASTALIKLARI
- GÖZ PROBLEMLERİ



NEXAVAR (SORAFENİBE) 200 MG/112 TB



- ▶ DOZ GÜNDE İKİ KEZ İKİŞER TABLET
- ▶ AÇ VEYA DÜŞÜK-ORTA YAĞLI YİYECEKLERLE KULLANILABİLİR

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



NEXAVAR (SORAFENİBE) 200 MG/112 TB



- ▶ ÇİĞNENMEMELİ, EZİLMEMELİ
- ▶ UNUTULAN DOZLARI DENGEMEK İÇİN ÇİFT DOZ ALINMAMALI

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ

NEXAVAR (SORAFENİBE) 200 MG/112 TB

- ▶ İLERLEMİŞ RENAL HÜCRELİ KANSER
 - ▶ (IF- α VEYA IL-2 TED YANITSIZ)
- ▶ BÖLGESEL İLERLEMİŞ KARACİĞER KANSERİ
 - ▶ (CHILD-A YETM OLAN GİRİŞİMSEL TEDAVİLERİN UYGUN OLMADIĞI HASTALAR)

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



NEXAVAR (SORAFENİBE) 200 MG/112 TB



► YAN ETKİLERİ

- LENFOPENİ, KANDA FOSFAT AZLIĞI
- KANAMA SORUNLARI
- EL, AYAK DERİ REAKSİYONLARI
- HİPERTANSİYON
- İSHAL, BULANTI, KUSMA
- KAŞINTI, SAÇ DÖKÜLMESİ



NEXAVAR (SORAFENİBE) 200 MG/112 TB



- ▶ KONTRENDİKASYON; GEBELİK VE LAKTASYON
- ▶ DİKKATLİ KULLANIM GEREKEN DURUMLAR;
 - ▶ ELLER VE AYAKLARDA DERİ DÖKÜNTÜLERİ (İLK 6 HAFTA)
 - ▶ KAN BASINCININ YÜKSELDİĞİ DURUMLAR
 - ▶ KANAMA HASTALIKLARI, ANTİKOAGULAN KULLANIMI
 - ▶ ANİ KARIN AĞRILARI
 - ▶ İRİNOTEKAN, KAPESİTABİN, DOSETAKSEL KULLANIMI
 - ▶ NEOMİSİN KULLANIMI



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.....

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



REFERANSLAR



- ▶ Rx Media Pharma
- ▶ www.drugs.com
- ▶ www.ibrance.com
- ▶ www.medscape.com

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ



TEŞEKKÜRLER.....

ONKOLOJİ ECZACILARI DERNEĞİ